



MAGISTRÁLITER

Projekt Slovenskej lekárskej komory

www.slek.sk/magistraliter

Názov

Roztok s genciánovou vioľou (roztok metylrozanilíniumchloridu) 0,5 %

Receptúra

Methylrosanilinii chloridum	0,5
Aqua purificata	ad 100,0

M. f. sol.

D. S. 3 x denne potierať postihnuté miesto.

Popis

číra tmavofialová kvapalina so slabým charakteristickým pachom

Použitie

dermatologikum – antiseptikum, antimykotikum, slabé adstringens, mierne lokálne anestetikum

Postup prípravy

Naváži sa genciánová vioľ (metylrozanilíniumchlorid, pyoktanín) – fialové farbivo a rozpustí sa v kadičke v čistenej vode. Roztok sa prefiltruje. Pripravený roztok sa adjustuje do sklenenej liekovky. Označí sa červenou signatúrou. Uchováva sa pri teplote $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, chránený pred svetlom.

Poznámka: Koncentrácia 0,5 % sa používa u detí do 12 rokov. U novorodencov a kojencov sa používa koncentrácia 0,1-0,3 %. U dospelých a u detí od 12 rokov (na obmedzené plochy) sa používa koncentrácia nad 0,5 %. Nesmie sa aplikovať na otvorené rany, do Bercových vredov. Na sliznicu sa používa koncentrácia 0,1-1,0 % (najčastejšie 0,5 %). Roztok sfarbí dlhodobo predmety, prádlo a kožu.