Názov

Roztok s genciánovou violeťou (roztok metylrozanilíniumchloridu) 1,0 %

Receptúra

Methylrosanilinii chloridum	1,0
Ethanolum 96 %	7,5
Aqua purificata	ad 100,0

M. f. sol.

D. S. 3 x denne potierať postihnuté miesto.

Popis

číra tmavofialová kvapalina so slabým charakteristickým pachom

Použitie

dermatologikum – antiseptikum, antimykotikum, slabé adstringens, mierne lokálne anestetikum

Postup prípravy

Naváži sa genciánová violeť (metylrozanilíniumchlorid, pyoktanín) – fialové farbivo a rozpustí sa v kadičke v etanole 96 %. Pridá sa čistená voda. Roztok sa premiešaa prefiltruje. Pripravený roztok sa adjustuje do sklenenej liekovky. Označí sačervenou signatúrou. Uchováva sa pri teplote 25 °C ± 2 °C, chránený predsvetlom. Čas použiteľnosti je 6 mesiacov.

Poznámka: U dospelých a u detí od 12 rokov (na obmedzené plochy) sa používa koncentrácia nad 0,5 %. Koncentrácia 2% sa používa u dospelých na kožu len výnimočne – používa sa ako zásobný roztok na k príprave 0,3-1,0% roztokov genciánovej violeti. Nesmie sa aplikovať na otvorené rany, do Bercových vredov. Na sliznicu sa používa koncentrácia 0,1-1,0 % (najčastejšie 0,5 %). Roztok sfarbí dlhodobo predmety, prádlo a kožu.

© Slovenská lekárnická komora